

# 위 내시경 검사 동의서

상부 위장관 내시경 검사는 식도나 위 혹은 십이지장에 발생하는 여러 종류의 질환(예, 위암, 위궤양, 십이지장궤양, 식도염 등)을 진단하는데 기본적으로 정확한 검사입니다. 내시경 검사에서는 드물지만 합병증 발생의 가능성이 있습니다.

구역질/구토/기침에 인한 식도 입구 주위의 부종/발작/인후부 통증, 내시경 검사를 위하여 사용하는 여러 가지 약물에 대한 알레르기, 두드러기, 천식, 기도폐쇄 및 호흡정지 등의 과민반응, 심장 부정맥 혹은 심근 경색증의 악화 및 심정지, 저산소증이나 흡인성 폐렴, 녹내장이나 전립선 비대증의 악화, 발열과 패혈증 같은 감염증, 식도-위장-십이지장의 출혈 및 천공, 내시경검사에 의한 수일 정도의 위염/속쓰림 및 위궤양 혹은 십이지장 궤양의 악화, 조직검사 후의 심한 출혈 같은 매우 다양하고 때로는 매우 심각한 합병증이 발생할 수 있습니다

## 위 조직검사

정확한 진단을 위하여 의사의 판단에 따라 의심되는 부분에 대한 조직검사를 시행하는 경우가 있습니다. (위 조직검사 미실시로 인해 발생하는 진단적 오류는 본원이 책임지지 않습니다.)조직검사를 시행한 경우는 개수에 따라 추가비용이 발생합니다.

♣ 위 내시경 검사 중 이상소견이 있을 경우 위 조직검사를 시행하는데 동의하십니까?  예 /  아니오

본인은 위 내시경 검사 전 위의 내용을 숙지하였으며 부작용 발생시 이의를 제기하지 않을 것을 서약하며 자의에 의해 검사를 신청합니다

■ 신청인: (인) ■ 주민등록번호: -

20    년    월    일

# 의식하 진정(수면) 내시경 검사 동의서

의식하 진정(수면) 내시경 검사는 주사로 약물을 투여하여 환자를 어느 정도의 진정상태에 도달하게 한 후 검사를 하는 것으로 환자를 마취한 상태로 하는 검사는 아니며 ‘환자의 협조가 가능한 진정상태’ 에서 검사를 합니다. 약물에 잘 반응하지 않은 경우에는 검사가 불충분하게 될 수 있으며 수면유도가 안 될 수도 있습니다. 흔치 않으나 호흡정지, 심장정지, 치명적인 간 손상, 혼수 내지는 사망에 이를 수 있는 등 심각한 합병증이 발생할 수 있습니다.

## 수면내시경 검사시 주의사항

- 수면내시경검사 후에는 완전한 회복을 위하여 **안정**이 필요합니다.
- 혈관주사에 의해 진정상태에 도달하며 개인차가 크지만 평균 30분, 지속되면 드물게 2시간 이상 지속될 수 있습니다.
- 검사 후 3~4시간 정도는 충분한 휴식을 취하여야 하며 검사당일 운전, 기계조작, 운동, 중요한 결정 및 회의 참석 등은 금합니다. (위험)
- 수면내시경 검사 후에는 안정이 필요하며 낙상 등의 위험을 예방하기 위해서 보호자분께서 반드시 동행하셔야 합니다.

본인은 위 내시경 검사 전 위의 내용을 숙지하였으며 부작용 발생시 이의를 제기하지 않을 것을 서약하며 자의에 의해 검사를 신청합니다

■ 신청인: (인) ■ 주민등록번호: -

20    년    월    일

# 위내시경 검사 안내문

## 1

위 내시경검사는 내시경기기를 구강을 통하여 식도, 위, 십이지장까지 삽입하여 염증, 궤양, 악성종양 등의 질환을 직접 관찰하는 것을 목적으로 하며 필요에 따라 조직검사를 통하여 보다 정확한 진단을 합니다. 일반적으로 5분 내외에 시행되며 조직검사 시에는 조금 더 길어 질 수 있습니다.

### 위내시경의 필요성

- ▶ 상부 위장관 출혈이 의심되는 경우 (흑색변이나 혈변, 토혈등의 증세)
- ▶ 속쓰림, 상복부 불편감, 구역, 구토, 소화 불량 등의 증상이 있을 때
- ▶ 과거에 소화성 궤양을 앓았거나 현재 이로 인하여 치료 중 일 때
- ▶ 과거에 위암이나 궤양, 기타 위장 질환으로 수술을 받은 경우
- ▶ 특별한 증상이 없어도, 남성40세, 여성 45세 이상의 분들은 1년에 1회 정도의 위내시경 검사가 조기 위암 및 기타 질환의 발견을 위해 반드시 필요합니다

## 2

### 위내시경 검사의 방법 및 절차

- 1) 내시경검사에 필요한 문진을 한 후, 정상적인 위 운동에 따른 움직임을 줄여 검사를 용이하게 하는 위장관 운동 억제제와 위 내 정상적으로 존재하는 거품과 가스를 제거하여 검사를 용이하게 하는 가스제거제를 복용합니다. 수면 내시경의 경우 혈관주사를 맞습니다
- 2) 내시경을 삽입하기 편리하도록 왼쪽 옆으로 눕습니다.
- 3) 내시경을 시작합니다.
- 4) 정확한 진단을 위하여 조직검사를 할 경우 통증은 전혀 없고 출혈도 금방 지혈됩니다.  
(조직검사를 할 경우 추가비용이 발생합니다.)
- 5) 검사종료 후 회복실에서 충분한 회복을 합니다.

## 3

### 위내시경 검사 준비사항

- 1) 검사 **8시간 전부터 금식**만 하시면 검사가 가능합니다.
- 2) 아침을 드시지 않고 병원에 오시면 바로 검사를 받으실 수 있습니다.

## 4

### 위내시경 검사 전/후 주의사항

- ▶ **검사 전** → 검사 전 틀니를 제거하고 흔들리는 치아가 있을 경우 반드시 직원에게 말씀해 주세요.  
→ 항혈소판제인 아스피린이나 항응고제 와파린 또는 쿠마딘, 플라빅스 약물을 복용중인 분은 의사와 상담하여 일주일정도 중단하고 오셔야 조직검사가 가능합니다.  
**(조직검사시 출혈위험성이 있기 때문입니다.)**  
→ 심혈관질환(협심증, 심근경색, 뇌졸중), 호흡기질환(천식, 만성폐쇄성폐질환), 만성 신질환자, 만성 간염, 간질환자, 약물 부작용 과거력 환자, 알레르기, 임신부, 특이체질환자는 사전에 의료진에게 알려야 합니다.
- ▶ **검사 후** → 목마취가 풀리는데 약 1시간 정도 걸립니다. 그때까지는 **금식**을 유지하셔야 합니다  
→ 조직검사를 시행한 경우에는 **2시간 정도 금식**을 한 후 **미지근한 물과 부드러운 음식**으로 식사합니다.  
→ 수면내시경을 한 경우에는 회복 후에도 간혹 어지럽기 때문에 운전이나 고도의 집중을 요하는 작업은 피하세요. 보호자와 함께 귀가하는 것이 좋습니다.